



Фигура 1. Обилно отделяне на слюнка

Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни.

Боледават:

- ♦ говеда и биволи
- ♦ овце и кози
- ♦ домашни и диви свине
- ♦ елени, сърни
- ♦ други

Клинично болестта протича с:

- ♦ висока температура,
- ♦ обилно отделяне на слюнка (фиг. 1),
- ♦ мехурести изриви преминаващи в разранявания (лезии) по устната кухина (фиг. 2), езика (фиг. 3), ноздрите, устните, копитния ръб (фиг. 5 и 8), междукопитното пространство (фиг. 6) и вимето (фиг. 4).
- ♦ рязко спадане на млеконадой.



Фигура 2. Лезии по езика и устната кухина



Фигура 5. Лезия по копитния ръб



Фигура 6. Лезия в междукопитното пространство



Фигура 9. Възловидни изменения по кожата

Заразният нодуларен дерматит е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, характеризира се с:

- ♦ треска,
- ♦ изрив от възловидни образувания по кожата.

Болестта води до намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата и нанася големи икономически загуби.

Предаването и разпространение на болестта става

- ♦ механично, чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи,
- ♦ чрез директен и индиректен контакт между здрави и болни животни.

Шап по чифтокопитните животни



Фигура 3. Лезии по езика

Нанася големи икономически загуби, вследствие на загубената продуктивност на заболелите животни и ограничаване на търговията и невъзможност за движение на възприемчиви животни от засегнатите региони.

Източник на инфекцията са болните животни, които отделят вируса със слюнка, мляко, изпражнения и урина. Предаването и разпространението на болестта става:

- ♦ чрез контакт между здрави и болни животни;
- ♦ механично, чрез замърсени с вируса фуражи, инвентар, транспортни средства, постеля и други.



Фигура 4. Изменения по вимето



Фигура 7. Мехури по рилото



Фигура 8. Изменения по копитата

Заразен нодуларен дерматит



Фигура 10. Разязвени изменения по кожата



Фигура 11. Изменения по вимето

Ежегодна профилактична ваксинация срещу болестта е най-надеждната мярка за гарантиране на безопасността на Вашите животни

По-тежко боледават млекодайните породи говеда, в пика на лактация и младите животни. Характерна е треската, придружена от депресия, застояване, слюнотечение и слизести изтечения от очите, които може да бъдат последвани от конюнктивит, а в някои случаи и от слепота. Обикновено лимфните възли са видимо уголемени. Появата на възловидни кожни лезии обикновено започва 48 часа след началото на треската. Те могат да бъдат многобройни по цялото тяло (фиг. 9) или могат да бъдат само няколко. Възелчетата могат да изчезнат без последствия или да се разязвят (фиг. 10). Най-често тези изменения се наблюдават по кожата на главата, врата, перинеума, гениталиите, вимето (фиг. 11) и крайниците. Нодулите (възелчетата) са с размер 5 до 50 mm в диаметър, кръгли и набъбнали и включват кожата, подкожната тъкан и понякога дори подлежащите мускули. Белезите могат да останат за неопределено време, като по този начин правят кожата негодна. Биците губят плодовитостта си, а бременните крави могат да абортират.

ОСОБЕНО ОПАСНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ



Фигура 12. Папули в устната кухина



Фигура 13. Папули по корема и вимето



Фигура 14. Папули по вимето



Фигура 15. Афи в устната кухина



Фигура 16. Изтечения от носа



Фигура 17. Изтечения от устата и напукана муцуна

Шарка по овцете и козите

Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване.

Клинично при овцете и козите болестта протича с:

- ♦ треска и депресия;
- ♦ генерализиран изрив от папули (възловидни образувания) по кожата на цялото тяло;
- ♦ пневмонични огнища в белите дробове.

Кожните изменения (лезии) се наблюдават по главата, устната кухина (фиг. 12) и обезкосмените части на тялото — коремната област (фиг. 13), основата на опашката, вимето (фиг. 13 и 14), гениталиите, вътрешните части на крайниците. Главата изглежда уголемена и деформирана. Протичането на болестта може да завърши със смърт.

Източник на инфекция са болните животни.

Предаването на болестта става с:

- ♦ директен контакт между болни и здрави животни;
- ♦ контаминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства, постеля.

Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване по овцете.

Протича с:

- ♦ треска и депресия;
- ♦ изтечения от очите, носа (фиг. 16) и устата (фиг. 17);
- ♦ афи в устната кухина (фиг. 15), сухи и напукани муцуна и ноздри (фиг. 16 и 17);
- ♦ диария;
- ♦ кашлица и затруднено дишане и хранене.

Избягвайте:

- ♦ контакт с животни от други стада;
- ♦ посещение на други животновъдни обекти;
- ♦ размяна и споделяне на животни, инвентар, превозни средства с други животновъдни обекти.

ВНИМАНИЕ!

Всяко съмнение за заразна болест по животните, трябва незабавно да се съобщава на официален ветеринарен лекар.

По този начин може да спасите хиляди животни и да предотвратите огромни икономически загуби за страната!

Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за ограничаване на по нататъшното ѝ разпространение!